

Estudio comparativo sobre intención de contarle al niño sus orígenes en tratamientos de reproducción asistida con donación de gametos y embriones

Baccino, G*; Urdapilleta, L.**; Hernández E.R*

*Clínica FivMadrid, Madrid; **Clínica Cegyr, Buenos Aires



ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Revelar los orígenes genéticos al niño en tratamientos de reproducción asistida con donación de gametos continúa siendo un tema controvertido y de necesario abordaje a nivel nacional e internacional (Cowden, 2012). Si bien, en España ya existen datos sobre la intención de pacientes españoles en relación a la revelación al niño (Baccino y cols. 2013), resulta interesante conocer datos sobre países hispanoparlantes de otro continente, en este caso Argentina, con un entorno legal y cultural potencialmente similar.

Nuestro **objetivo** ha sido investigar si los pacientes argentinos tienen intención de revelar los orígenes al niño y compararlo con los pacientes españoles en tratamiento de fertilidad.


MÉTODOS / METHODS

Estudio prospectivo, multicéntrico, octubre 2010-noviembre 2013, en dos clínicas privadas de diferentes continentes, con legislaciones similares (FivMadrid, España y Cegyr, Argentina). En total, fueron completados **228 cuestionarios**.


Analizamos: edad, tipo de familia, de tratamiento, nivel educativo, intención de revelación al niño y a otros, cuándo piensan revelarlo, si piensan que ha sido buena decisión recurrir a donación, si sentirán al niño como suyo, preocupación por las características físicas de los donante, y si les gustaría conocer al donante. Comparamos los datos de ambos países. Una $P < 0.05$ fue considerada significativa.

RESULTADOS / Results

Intención de contárselo al niño ($P < 0.05$):



¿Le interesaría conocer al donante? ($P > 0.05$)



- Si bien el matrimonio homosexual en Argentina es legal, en la muestra argentina sólo hay parejas heterosexuales y mujeres solas.
- No se encontraron diferencias entre ambos países en relación a la edad de los miembros de las parejas heterosexuales, pero sí en la edad de las madres solas por elección ($P < 0.05$).
- Diferencia significativa ($P < 0.05$) entre países cuando se trata de pacientes que han alcanzado licenciatura o grados superiores. La población argentina, en nuestro estudio, posee mayor nivel educativo.
- En ambos países, la mayoría de los pacientes tiene intención de revelarlo, si bien en Argentina son aún más los pacientes que quieren hacerlo ($P < 0.05$).
- Si bien en la población española casi la totalidad de las parejas tenían la misma opinión (96%), en la población argentina, el 23% de las parejas de quienes han completado el cuestionario opina distinto. ($P < 0.05$)
- La mayoría de ambos grupos (57% Argentina y 51% España) no le interesaría conocer al donante, sin embargo el 30% de argentinos y 42% de españoles no lo tienen claro.
- No hay diferencias entre grupos, en cuanto a la edad de revelación. La mayoría (85% España y 84% Argentina) lo revelará en la primera infancia, seguido por la adolescencia y adultez.
- No hay diferencias entre grupos ($P > 0.05$) al sentir al niño como propio, decisión recurrir a donación de gametos, preocupación de las características físicas de los donantes, y en la intención de contarle a otros.
- Diferencias significativas entre grupos ($P < 0.05$): la población argentina refiere sentir mayor necesidad de apoyo psicológico durante el tratamiento y a posteriori.

CONCLUSIONES / Conclusions

Pacientes de España y Argentina no presentan diferencias significativas en relación a la intención de revelar al niño sus orígenes, en relación a la intención de no querer conocer al donante, y también resulta similar en ambos países la edad elegida de revelación al niño, entre otros. Sin embargo, las diferencias significativas encontradas también resultan interesantes de abordar en futuras investigaciones.